

TOLEDO®

FUNGICIDA – Registro N°: 71 – F8/NA

Grupo Químico:	Triazole
Ingrediente Activo:	Tebuconazole
Concentración:	250 gramos por litro
Formulación:	Concentrado Emulsionable - EC
Cat. Toxicológica:	III Ligeramente Peligroso
Formulador:	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTDA.
Objetivo Biológico:	Sigatoka, Sarocladium, Tizón foliar del maíz, Tizón temprano.
Modo de acción:	Fungicida sistémico; protectante curativo.
Mecanismo de Acción:	Actúa realizando una desmetilación de esteroides (biosíntesis de ergosterol)

GENERALIDADES

TOLEDO® es un fungicida de rápida acción sistémica protectora, curativa y erradicante que se absorbe rápidamente por las partes vegetativas de la planta y se trasloca acropétalmente, lo que genera un excelente control de estados avanzados de infección y esporulación.

RECOMENDACIONES DE USO

TOLEDO® puede ser utilizado mezclado con agua, aplicado a campo abierto o bajo invernadero, siguiendo las dosis de aplicación recomendadas en este documento.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Para la aplicación de **TOLEDO®** se debe esperar la aparición de los primeros síntomas del patógeno; sin embargo, es conveniente realizar un muestreo o hacer observaciones en el cultivo, para estimar si un organismo determinado perjudica económicamente al agricultor, denominado nivel de daño económico.



DOSIS POR CULTIVO

CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA.)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. Difformis)	0,4 – 0,5 l/ha*
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>)	0,5 l/ha*
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Tizón foliar del maíz (<i>Helminthosporium turcicum</i>)	0,4 l/ha*
Plátano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. Difformis)	0,4 l/ha*
Tomate hortícola (<i>Lycopersicon esculentum</i> Miller.)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0,3 l/ha*

*Gasto de agua: en banano y plátano 100 l/ha, en arroz 200 l/ha; en maíz 300 l/ha, en tomate 200 l/ha;

PERÍODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA

Período de reingreso después de la aplicación: 12 horas después de aplicado.

COMPATIBILIDAD

TOLEDO® es compatible con la mayoría de insecticidas y Fungicidas del mercado, sin embargo, en caso de mezcla con productos en la que no se conozca su selectividad al cultivo y/o compatibilidad de mezcla, recomendamos bajo responsabilidad del usuario realizar una prueba a pequeña escala, antes de la aplicación comercial.





FITOTOXICIDAD

Usado a las dosis recomendadas en este documento no presenta ningún daño en el cultivo tratado.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.”

*Elaborado por:
Departamento Técnico ROTAM ECUADOR.
Enero del 2017.*

