

GT-BAMAKO 70WG-LEAFLET-20190304

SIZE: 180(W)X150(H)MM

PGTB01M010190304

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



TÓXICO PARA ABEJAS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

BAMAKO® 70 WG no es persistente en el suelo, ni en el agua. Aplicar el producto en condiciones de viento calmo, no lluvia, en épocas de no floración o cuando las abejas no estén en actividad sobre el cultivo a tratar (aplicar temprano en la mañana), dejando franjas de seguridad respecto a cuerpos de agua, animales o casas de habitación, siguiendo las recomendaciones de la etiqueta y de la hoja de seguridad.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO. ASEGURESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERA DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfóreolos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, el manejo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza a sí mismo la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FORMULADOR:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, CO., LTD. CHINA.
N° 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu.
TEL: 0512 - 5771 - 1988 FAX: 0512 - 5771 - 8697

PAÍS
GUATEMALA

NUMERO DE REGISTRO
756-5

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

BAMAKO® 70 WG

INSECTICIDA - NEONICOTINOIDE
IMIDACLOPRID



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Insecticida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN:

BAMAKO® 70 WG es un insecticida sistémico translinar con acción estomacal y por contacto. Actúa como un antagonista al enlazarse a los receptores nicotínicos post-sinápticos en el sistema nervioso central del insecto, generando parálisis inmediata del insecto plaga. El imidacloprid pertenece al grupo químico de los neonicotinoides nitroguanidinas, grupo 4A del IRAC.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

BAMAKO® 70 WG puede ser aplicado con equipo de aspersión terrestre ya sea estacionario o manual como bomba de espalda y por sistema de riego por goteo. Utilizar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 gm aproximadamente y a presión constante (40 a 60 psi). Se debe verificar que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado de funcionamiento sin fugas y correctamente calibrado. El personal que manipule este producto, deberá utilizar el equipo de protección personal apropiado: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador. Antes de iniciar cualquier aplicación se debe verificar que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Se recomienda hacer una premezcla con la dosis a utilizar luego llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar, adicione la cantidad requerida de premezcla preparada del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. Siempre mantenga la agitación constante. Utilice dosificadores para gránulos dispersables, paletas de agitación y recipientes para realizar la mezcla. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use el equipo de protección completo. El equipo y los utensilios utilizados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. El pH de la aplicación debe ser de 5-7.



GT-BAMAKO 70WG-LEAFLET-20190304

SIZE:180(W)X150(H)MM

RECOMENDACIONES DE USO

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA, EL SALVADOR, HONDURAS Y BELIZE

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	250 g/ha (175 g/Mz)
Chile (<i>Capsicum frutescens</i>)		
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)		
Ornamentales		500 g/ha(350 g/Mz)

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Chile (<i>Capsicum frutescens</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0,17 – 1kg/ Ha
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Afidos (<i>Aphis sp.</i>)	(0,12 – 0,7 kg/Mz)

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	350-700 g/ha (245-490 g/Mz)	Mezcle la dosis en 570 L de agua por hectárea (400 L/ Manzana). Utilizar un volumen de mezcla que garantice un buen cubrimiento de la planta y que asegure buena penetración. Realizar las aplicaciones dirigidas al envés de la hoja, sitio donde están las ninfas de la mosca blanca. Utilizar coadyuvante para mejorar la distribución del producto en la planta. Aplicar al suelo dirigido al pie de la planta 1 a 7 días después del trasplante. También se puede aplicar en riego por goteo. En el cultivo de papa con el surco abierto.
Chile (<i>Capsicum annum</i>)			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)			
Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)			
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)			
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata o cigarrita del arroz (<i>Togodes orizicolus</i>)	50-100 g/ha (35-70 g/Mz)	Aplicarlo solo o en mezcla con el herbicida de 8 a 15 días después de la siembra. Segunda aplicación 30 a 45 días después de la siembra (si es necesario). Aplicar al suelo dirigido al pie de la planta de 1 a 7 días después del trasplante. También se puede aplicar en riego por goteo.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar con la presencia de los primeros insectos o preventivo en lotes con historial de ataques tempranos.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Para prevenir la resistencia en los insectos, se recomienda utilizar el producto desde la aparición de los insectos; al ingrediente activo se recomienda no usarlo más de dos veces por ciclo de cultivo y rotar con productos de diferente grupo químico y mecanismo de acción.

INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para todos los cultivos: 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se puede reingresar al área tratada una vez seco el rocío de aspersión; de lo contrario, se recomienda utilizar el equipo de protección indicado.

FITOTOXICIDAD:

BAMAKO® 70 WG no es fitotóxico a los cultivos en la dosis y forma de uso aquí indicado.

COMPATIBILIDAD:

Utilizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, **BAMAKO® 70 WG** es compatible y se puede aplicar en mezcla con otros productos agroquímicos de uso común en agricultura, sin embargo, no deben dejarse mezclas de un día para otro. Antes de realizar una mezcla por primera vez se recomienda realizar una prueba. Evite mezclar con productos muy alcalinos o muy ácidos, ya que causan la hidrólisis del ingrediente activo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicina, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Almacénelo bajo llave, en un lugar fresco, seco, alejado del calor o del fuego. Conserve o almacene este producto en su envase original, etiquetado y debidamente cerrado. Transporte y almacene aparte de herbicidas. **BAMAKO® 70 WG** no es inflamable ni corrosivo, pero no debe colocarse cerca de fuentes de calor intenso.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede ocasionar irritación de la nariz, irritación de la garganta y pulmones si es inhalado. En caso de ingestión causa náuseas, vómito, diarrea, cefalea, toxicidad sistémica. Puede producir falla hepática.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15-20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

UNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO NO TIENE ANTÍDOTO.

BAMAKO® 70 WG no tiene antídoto específico. Trate sintomáticamente.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Guatemala	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-000-29832
Belize	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	2231-1548
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2316
Nicaragua	Centro de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	2289-4700
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	Ext: 1294 / 8755-0983
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	2223-1028
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan)	809-332-6666
	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	809-681-7828