

HiBio®

ES AVANCE EN COBRE

HiBio® OX+

¿Qué es HiBio® OX+?

Es un bactericida y fungicida de amplio espectro, para uso preventivo y curativo para el control de hongos y bacterias fitopatógenas en los cultivos. Sus componentes tienen efecto sinérgico, donde primeramente actúan los iones del Cobre (Cu+2) y posteriormente el efecto sistémico de la Kanamicina.

¿Cómo actúa HiBio® OX+?

Inhibe la síntesis proteica al unirse de manera irreversible a la unidad ribosomal impidiendo la transcripción del DNA bacteriano, además altera la permeabilidad de la membrana tanto de los hongos como de las bacterias al ocasionar daños y permitir la entrada de cantidades altas tanto de iones cobre como de antibióticos.

Es un fungicida y bactericida protectante y sistémico, que combina la eficacia de un antibiótico inhibidor de la síntesis de proteínas como lo es la Kanamicina y el efecto de amplio espectro de los iones de cobre del Trióxido de Cloruro de Di cobre HiBio®.

Penetra en la planta y se transporta a los puntos donde se multiplican, controlando de manera curativa al evitar la reproducción de las bacterias. También controla las hongos y bacterias de manera preventiva cubriendo de manera efectiva el tejido vegetal evitando así, su penetración a la planta.

GRUPO QUÍMICO: ANTIBIÓTICOS Y CÚPRICOS.	
TIPO DE PRODUCTO: BACTERICIDA.	
INGREDIENTE ACTIVO:	% en peso
SULFATO DE KANAMICINA	2.0
Kanamicina: Sulfato de 2-(aminometil)-6-[4,6-diamino-3-[4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil) tetrahidropiran-2-il]oxi-2-hidroxi-ciclohexoxi]-tetrahidropiran-3,4,5-triol equivalente a 20 g de i.a./kg).	
Oxicloruro de Cobre: Trióxido de Cloruro de Dicobre (equivalente a 200 g de i.a./kg).	20.0
Adherente, dispersante y vehículo.	78.0
TOTAL	100.0

REG. RSCO-MEZC-FUNG-0313-0328-X0058-003-23.5



HiBio® OX+

Método de preparación

Usando el equipo de protección personal indicado en el apartado de precauciones y advertencias de uso de la etiqueta. Abra cuidadosamente el producto.

En un recipiente con agua mezcle en la dosis indicada para la aplicación hasta producir una pre mezcla uniforme. Sin dejar de agitar agregue esta pre mezcla al tanque de aplicación que contenga solo agua hasta la mitad de su capacidad. Manteniendo la agitación llene con agua el resto del tanque y continúe agitando hasta tener una mezcla homogénea.

Aplíquese con el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del follaje.

No aplique cuando amenace la lluvia o esté presente, a fin de evitar el lavado del producto o cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 Km/h, para evitar deriva del producto y evite aplicarlo en horas de calor intenso para evitar pérdida del producto o quemaduras del follaje.

Ventajas

El Trióxido de Cloruro de Di cobre, formulado con tecnología HiBio® (HiBio® OX) ejerce una acción múltiple en las células de los hongos: bloqueo del proceso respiratorio.

Inhibición de la síntesis de proteínas y la reducción de la actividad de la membrana celular.

El ión Cobre (Cu+2) tiene tecnología HiBio® que permite aplicar una menor cantidad de cobre metálico por unidad, reduciendo la dosis por hectárea de cobre metálico sustancialmente.

- Aumentar la biodisponibilidad y liberar sólo la cantidad necesaria de iones de cobre, para una mejor protección.
- Aumentar el número de iones Cobre liberados, promoviendo una mayor eficacia biológica para cultivos.
- Evitar formación de cristales para no causar fitotoxicidad.
- Menos residuos en el suelo y disminuir el riesgo de impacto negativo para el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA_



HiBio® OX+

Recomendaciones de uso

Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras pese con la ayuda de una báscula o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de HiBio® OX+ y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

Se deberá usar el equipo de protección personal que se menciona en el apartado de precauciones.

Volumen de aplicación 150–250L de agua/ha.

.....

Contraindicaciones

No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

.....

Incompatibilidad

Si desea mezclar, hacerlo solo con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

Precauciones

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de HiBio® OX+ como son: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes protectores de plástico transparente, mascarilla con respirador, guantes y botas de neopreno, para evitar el contacto directo.

Después de la jornada laboral se deberá descontaminar y almacenar en el lugar de trabajo el equipo de protección.

Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.

Después de manejar y aplicar el producto báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla.

.....

Fitotoxicidad

HiBio® OX+ no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta ficha técnica.

FICHA TÉCNICA_



HiBio® OX+

Manejo de resistencia

Para prevenir el desarrollo de poblaciones bacterianas resistentes, siempre respete la dosis y la frecuencia de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros activos de diferente modo de acción y diferente mecanismo de detoxificación.

Úsese exclusivamente en los cultivos y enfermedades aquí recomendados. Siempre calibre el equipo de aplicación.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	INDICACIONES
Tomate Okra Tomate verde Chile Papa Berenjena (0)	Marchitez bacteriana (<i>Pseudomonas solanacearum</i>)	750-1250	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación 150 - 250L de agua/ha.

Tiempo de re entrada a zonas tratadas: 24 horas

() Intervalo de Seguridad: (0) Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.